



Le plus récent ajout au programme RASC^{MD} : RASC^{MD} Pronto^{MD}

HLS Therapeutics Inc. est déterminée à trouver des solutions permettant d'optimiser le parcours des patients du début à la fin, y compris les bilans sanguins réguliers chez les personnes prenant de la clozapine. C'est pourquoi HLS Therapeutics Inc. est heureuse de présenter **RASC^{MD} Pronto^{MD}, un dispositif d'analyse de sang capillaire au point de service conçu pour faciliter la surveillance hématologique exigée chez les patients traités par CLOZARIL^{MD} (clozapine).**

RASC^{MD} Pronto^{MD} permet de réaliser des analyses sanguines en clinique et d'obtenir la numération des leucocytes et le pourcentage de neutrophiles durant la consultation. En obtenant les analyses sanguines nécessaires sans perdre en efficacité, vous pouvez consacrer plus de temps à l'essentiel : vos patients; votre charge de travail associée aux suivis de vos patients, s'en trouve allégée.

En quoi l'utilisation de RASC^{MD} Pronto^{MD} pour obtenir des résultats rapides, intégrés et aussi précis qu'en laboratoire peut-elle vous aider?

En accélérant les décisions de traitement et en plaçant les patients au cœur de la prise de décision, ce nouvel ajout au programme RASC^{MD} vise à instaurer une nouvelle ère de soins personnalisés pour les patients atteints de schizophrénie réfractaire :

1. Tests sur place grâce au système d'analyse au point de service
2. Amélioration de la continuité des soins
3. Intégration harmonieuse au profil RASC^{MD} actuel de vos patients



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.CSANPronto.ca ou appelez RASC^{MD} au 1-800-267-2726.

CLOZARIL^{MD} (clozapine) est indiqué dans le traitement symptomatique de la schizophrénie réfractaire¹.

Veuillez consulter la monographie de CLOZARIL^{MD} à l'adresse http://www.hlstherapeutics.com/wp-content/uploads/monograph_pdf/HLS-Clozaril-PM-F.pdf pour obtenir des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en appelant au 1-800-267-2726.

RASC^{MD} Pronto^{MD} est un dispositif au point de service indiqué chez les adultes seulement. Il s'agit d'un analyseur de sang total, ce qui suppose le prélèvement d'un échantillon de sang. Les échantillons de sang ne doivent être prélevés qu'avec les bandelettes d'analyse RASC^{MD} Pronto^{MD}, qui nécessitent une seule goutte de sang (environ 3,5 µL) par test. Les bandelettes d'analyse RASC^{MD} Pronto^{MD} sont destinées à un usage unique. Tous les échantillons de patients doivent être considérés comme potentiellement infectieux et manipulés de façon appropriée. Les précautions habituelles doivent être prises. L'équipement de protection individuelle doit être porté lors du traitement des échantillons, des tests de contrôle de la qualité ou des procédures d'entretien. Pendant l'utilisation, le dispositif RASC^{MD} Pronto^{MD} doit être placé sur une surface stable, qui ne bougera pas et ne risquera pas d'être soumise à des vibrations quelconques. Le dispositif ne doit pas être déplacé d'un endroit à un autre lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Pour en savoir plus sur le dispositif RASC^{MD} Pronto^{MD}, consultez le guide de l'utilisateur à l'adresse www.CSANPronto.ca avant de vous en servir. Vous pouvez également vous procurer le guide en appelant au 1-800-267-2726.

Référence :

1. Monographie de CLOZARIL^{MD}. HLS Therapeutics Inc. 31 mai 2021.

CLOZARIL, RASC et RASC Portail de soins aux patients + Conception sont des marques déposées de Novartis AG.

Pronto est une marque déposée de HLS Therapeutics Inc. Tous droits réservés.

© 2021 HLS Therapeutics Inc.

Août 2021

HLS Therapeutics Inc.

10 Carlson Court, Suite 701

Etobicoke (Ontario)

M9W 6L2



HLS Therapeutics®